

SO PASSEN SIE IHRE KOMBINATIONSTHERAPIE IHREM PERSÖNLICHEN BEDARF AN^{1,2}

STARTDOSIS
30 Dosisschritte[†]

NBZ-Mittelwert der letzten 3 Tage	Dosisanpassung 1x in der Woche
> 140 mg/dl (> 7,8 mmol/l)	+ 4 Dosisschritte ⁺
> 100 mg/dl (> 5,6 mmol/l)	+ 2 Dosisschritte ⁺
≥ 80 mg/dl (≥ 4,4 mmol/l)	keine Änderung
< 80 mg/dl (< 4,4 mmol/l)	- 2 Dosisschritte ⁺ oder nach Ermessen des Behandlers

NBZ = Nüchternblutzucker. [†]Entspricht 30 E Insulin glargin + 10 µg Lixisenatid; ⁺Jeder Dosisschritt enthält 1 E Insulin glargin und 0,33 µg Lixisenatid. ¹ Aroda VR *et al. Diabetes Care* 2016; 39: 1972-80; ² Rosenstock J *et al. Diabetes Care* 2016; 39: 2026-35 (LIXILAN-O).

Abgabe an Patientinnen und Patienten nur in
Verbindung mit einer Verordnung von SULIQUA®



SULIQUA®

Insulin glargin (100 E/ml) und Lixisenatid

TITRATIONSHINWEISE

