

**SO PASSEN SIE IHRE KOMBINATIONSTHERAPIE  
 IHREM PERSÖNLICHEN BEDARF AN<sup>1,2</sup>**

| NBZ-Mittelwert der letzten 3 Tage | Dosisanpassung 1x in der Woche                                   |
|-----------------------------------|--|
| > 140 mg/dl (> 7,8 mmol/l)        | + 4 Dosisschritte <sup>+</sup>                                   |
| > 100 mg/dl (> 5,6 mmol/l)        | + 2 Dosisschritte <sup>+</sup>                                   |
| ≥ 80 mg/dl (≥ 4,4 mmol/l)         | keine Änderung   |
| < 80 mg/dl (< 4,4 mmol/l)         | - 2 Dosisschritte <sup>+</sup> oder nach Ermessen des Behandlers |

NBZ = Nüchternblutzucker. † Entspricht 30E Insulin glargin + 10 µg Lixisenatid; + Jeder Dosisschritt enthält 1E Insulin glargin und 0,33 µg Lixisenatid. **1** Aroda VR *et al. Diabetes Care* 2016; 39: 1972–80; **2** Rosenstock J *et al. Diabetes Care* 2016; 39: 2026–35 (LIXILAN-O).

Abgabe an Patientinnen und Patienten nur in  
Verbindung mit einer Verordnung von SULIQUA®



# SULIQUA®

Insulin glargin (100 E/ml) und Lixisenatid

## TITRATIONSHINWEISE

